درس ۱۰ - بدن ما (۲)

الف)

۱- نادرست [۵۹] ۲- درست [۶۰] ۳- نادرست [۵۸]

ب)

۴- سیاهرگ [۵۵] ۵- بازدم - دم [۵۳] ۶- سلول‌های روده‌ی باریک - شش‌ها [۵۸ - ۵۳]

۷- کم [۵۶]

پ) ۸

الف - خون [۵۵] ب - بینی [۵۴] پ - قلب [۵۵] ت - مثانه [۵۹]

ت)

۹- گزینه‌ی ۳ [۵۵] ۱۰- گزینه‌ی ۲ [۵۸] ۱۱- گزینه‌ی ۴ [۵۶]

۱۲- گزینه‌ی ۱ [۵۹] ۱۳- گزینه‌ی ۱ [۵۵] ۱۴- گزینه‌ی ۱ [۵۴]

ث)

۱۵- دهان و بینی - نای - شش‌ها [۵۳]

۱۶- هنگام انجام کارهای سبک یا استراحت کردن و خواب، قلب آرام‌تر کار می‌کند، سرعت ضربان قلب کمتر و نفس کشیدن هم آرام‌تر می‌شود. [۵۶]

هنگام انجام کارهای سنگین، ورزش کردن و یا حتی در اثر استرس، قلب با سرعت بیشتری کار می‌کند و ضربان قلب زیاد می‌شود. در این زمان تعداد تنفس هم زیاد می‌شود.

۱۷- الف) ادرار [۵۹] ب) نبض [۵۶] پ) ۷۵ بار [۵۶] ت) سرخرگ [۵۵]

۱۸- تعداد ضربان قلب نرمال در ۶ - ۱۰ سالگی، ۷۰ - ۱۱۰ ضربه در دقیقه است. [۵۶] (تعداد ضربان قلب و تعداد نبض هر فرد با هم برابر است.)

۱۹- پاسخ پیشنهادی: قلب: گوجه فرنگی [۵۵] کلیه: لوبیا [۵۹]

روده: زنجبیل [۵۸] شش: انگور [۵۳]

۲۰- اطلاعات گیتا، اشتباه ثبت شده است؛ چون تعداد ضربان قلب و تعداد نبض هر فرد با هم برابر هستند. [۵۶]

۲۱ ـ سرخرگ : رگ‌هایی هستند که خون در آن‌ها از قلب به سمت بخش‌های مختلف بدن می‌رود.
[۵۵] سیاهرگ : رگ‌هایی هستند که خون در آن‌ها از سمت‌های مختلف بدن به سمت قلب برمی‌گردد.
مویرگ : برای رسیدن مواد مورد نیاز به سلول‌ها، باید رگ‌ها در نزدیک‌ترین مکان به آن‌ها قرار داشته باشند؛ به همین دلیل بعضی از رگ‌ها خیلی کوچک و باریک هستند تا بتوانند مواد را به سلول‌ها انتقال دهند. این رگ‌ها، مویرگ نام دارند.

۲۲ ـ هوا در بینی تصفیه و تمیز می‌شود. گرد و غبار و بعضی از آلودگی‌های موجود در هوا، در بینی به دام افتاده
[۵۴] و هوای سالم به شش‌ها می‌رسد؛ به همین دلیل بهتر است که تنفس از طریق بینی انجام شود.
چون دهان مثل بینی دارای مو و مخاط نیست و نمی‌تواند هوا را تصفیه کند.

۲۳ ـ در افراد دارای اضافه وزن، تعداد تنفس افزایش می‌یابد و برای اینکه هوای بیشتری در شش‌ها جا بگیرد،
[۵۳] حجم شش‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین افراد دارای اضافه وزن شش بزرگ‌تری نسبت به افراد لاغر دارند.

۲۴ ـ یکی از دلایلی که احتمال تشکیل سنگ کلیه را افزایش می‌دهد، حجم پایین ادرار است. حجم پایین ادرار
[۵۹] می‌تواند بخاطر کمبود آب بدن باشد.
سابقه‌ی خانوادگی، چاقی و رژیم غذایی نامناسب و حتی مصرف برخی داروها احتمال تشکیل سنگ کلیه را افزایش می‌دهد.

۲۵ ـ نظر هر دو شخص درست است.
[۵۷ و ۶۰] در افرادی که غذاهای پرچرب و سنگین مصرف می‌کنند، به مرور چربی مصرف شده در رگ‌ها رسوب می‌کند و مسیر عبور خون را تنگ‌تر می‌کند و حتی ممکن است رگ مسدود شود که در این صورت خطر سکته‌ی قلبی افزایش می‌یابد.

در افراد بیکاری، مقدار اکسیژن خون کاهش می‌یابد و دیواره‌ی رگ‌های خونی و حتی سلول‌های بافت قلب آسیب می‌بیند؛ بنابراین بیکار بودن خطر سکته‌ی قلبی را افزایش می‌دهد.